

$$=) \{$$

血絡。痛自肢體。走移右手指。繫於伸屈。脈數右甚。宜梔黃古譚先生法。緩緩圖功。

金瓜蜜六錢 紅花八分 甘草節一錢
薤根炭二錢 野赤豆三錢 路路通五分
黑芝藤五錢 丹皮二錢 驢皮膠二錢
大豆卷四錢 忍冬藤一兩 竹瀝一兩半

(三診) 脹消清熱漸爽。兼以開鬱通絡之劑。
。諸患告泰泰半。惟惡言乍清乍睡。
。昨明乍味。一時未得遂靜。脈左轉滑小。乃營陰虛矣。右關數於肺部。爲胃熱有餘也。病積久入腦。決痰挾火。機發未得驚動耳。圖治茲以泄養爲本。再以宣溫之品佐之。

迴顧與前瞻
(七) 維德

一萬二千萬兒童——其數目略等於美國的全體民衆。我國的嬰兒死亡率，在世界上，除印度外，當推爲第一。在紐西蘭國內，其兒童之死亡率爲千分之四十弱；而在我國，據伍連德博士的估計，約爲千分之五百，是則最低限度言之，在一千個兒童當中，便有一二百五十個，未及週歲即歸夭折。每年中我國約喪失一千萬小國民——兒童；若論爲他們預計安全，實施救濟，何致如是？據教育部的調查，我國共有四千三百萬學齡兒童；然在實際上得享受入學讀書之幸福者，僅達六十萬名，其餘百分之八十以上的兒童，完全流於失學，辜負了他們的黃金時代。西北數省發生災荒，因凍餓而死的兒童，每日約達五千名；人生慘苦事，前有過於此者？（未完）

血絡。痛自肢體。未移右手指。繫於伸屈。脈數右甚。宜病黃古譚先生法。錢緩圖効。

六錢 紅花八分 甘草節一錢
二錢 野赤豆三錢 路路通五分
五錢 丹皮二錢 驢皮膠二錢
四錢 忍冬藤一兩 竹瀝一兩沖
服清酒化散痰。兼以開鬱通絡之劑。
諸患告愈泰半。惟謂言午猶乍難。
乍明乍昧。一時未得達靜。脈左轉濡小。乃停陰虛矣。右關數於諸部爲胃陽有餘也。稍積久則重。決痰挾火。機發未得動耳。圖治茲以滋養爲本。再以宣洩之品佐之。

朱振聲
士醫
例

| | |
|-----------|---|
| 以四出時午至九上門 | 時 |
| 後時診止四下時午診 | 間 |
| 一弄第製藥雪上 | 診 |
| 家第一回會南海 | 所 |

掛號處啓

鈔儀署

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>期四八二第</p> <p>(日二十月二十年九十國民)</p> <p>◀ 分二洋售份每 ▶</p> <p>(口路廣登路馬三海上址節)</p> | | <p>定價價目</p> <p>每三個月出一張 全年出五張 每份售洋一元 全年售洋五元</p> | |
| <p>廣告價目</p> <p>每份售洋一元 全年售洋五元 每份售洋一元 全年售洋五元</p> | | <p>定價價目</p> <p>每三個月出一張 全年出五張 每份售洋一元 全年售洋五元</p> | |

腦海中……想
花容月貌的美西施

忽然問……見
雞皮鶴髮的老西施
居然能愈如狂者癲的想思病
足見心理學治病之萬能

(頤健李)

心火熾須心藥醫
 治虛勞證宜慎防
 汗脫
 經驗良方
 用煤爐者須知
 食鹽問答
 肺癆病療養法
 潘清泉先生驗案
 (十)

傳聞有一某姓者。性愚。善觀小說。一日讀西
施女之花容柳姿。嫵媚妖燒。愛不釋手。頓起

愛情破產：理所當然

| | | | |
|-----|----|--------------|-----|
| | 好日 | 二保友均竊久春。小程挽 | |
| | 而如 | 人無寒。 | 醒說青 |
| 大憲保 | 初益 | 九處欲之愛情惡常平日本其 | 到腦心 |
| 想云 | 疾試 | 可見驗。遍破惡之。 | 治 |
| 五元 | 本果 | 治福報無中。 | 用 |
| 角丸 | 效漏 | 上意西程結婦夫流過 | 膳著 |
| 不之 | 夫。 | 上意西程結婦夫流過 | 膳著 |
| 折每 | 妻不 | 購數有名醫心未惜潮度之 | |
| 不有 | 受服 | 有在醫心未惜潮度之 | |

名醫某者。深知病者係無形之想思。非藥餌所能治也。遂想一法。卽邀一老嫗。乘夜敲病者之臥房。佯曰。我卽西施。因君舊念。故來訪問。病者聞聲崛起。一覲老嫗。癡立不語。少頃。乃曰何老若耶。嫗曰。千餘年以來。如何不老。君忘之乎。病者憬然悟。而病遂瘳。觀此事亦可作治心病之一助。故泚筆記之。

治虛勞證宜慎防汗脫

人身之有汗。猶天地之有雨也。天地陰陽和而後雨。人身亦陰陽和而後汗。然雨不可過。過則田禾淹沒。汗不可過。過則身體虛弱。是以微汗之解肌者。可以助陽。去約熱。散外感。通經絡。消腫脹。利小便。排惡濁。出。汗之為用亦廣矣。若或大汗淋漓。又復因之亡陽。因之亡陰。或陰陽俱亡。脫其元氣。種種危機。更伏於汗之中矣。而在陰虛勞者。尤甚。虛勞之證。有易出汗者。其人外衛氣虛。一經發熱。汗即隨熱外泄。治之者宜於滋補藥中。加龍骨牡蠣。皆不宜。山黃肉以斂其汗。有分毫不出汗者。其人肌膚乾燥。津液枯少。陰分虛甚。不能應陽而化汗。其約熱之時。肌膚之乾燥益甚。亦易少加龍骨牡蠣與肉蓯蓉。以防其出汗。何者。蓋因其汗久不出。服藥之後。陰分滋長。能與陽分治。其人恆突然汗出。若其為解肌之微汗。病或因之減輕。若為淋漓之大汗。病必因之加重。且有一汗而即脫者。是以治此等證者。皆宜防其出汗。其服藥至服有起色之時。

經驗良方

瘋狗咬傷經驗方

一此方即抵當湯。去水蛭虻蟲。加地龍。白蜜與酒也。桃仁春生。聖藥和之氣。地龍殺食。得中和之性。酒以養陽。蜜以和陰。大黃能推陳致新。得蜜與酒。化苦寒為潤。其成去瘀生新之功。則邪去正安。於孕婦有益。故孕婦忌。孕婦忌。孕婦忌。命垂頃刻。孕婦忌。孕婦忌。孕婦忌。小兒忌。小兒忌。小兒忌。體力。減少分量耳。瘋狗咬傷。不必肌膚受傷。即衣服被咬。毫無傷損。毒亦傳染。但毒既發。萬不可服斑痧等藥。蓋是時腹中惡塊。已如斗大。不化其瘀血。而反以毒攻毒。必致悶死。戒之戒之。

用煤爐者須知

洋房浴室中。皆如是也。又以水壺置於爐上。使水蒸氣充滿室內。則凡所有一養化炭。無不為二養化炭。由下方多數小孔中。排洩而出。無害於人。其原理。蓋水之定性分析。雖為二倍之輕與一倍之養。而以重量分析。則每一介水中。所含之養。實比所含之輕。有七倍之多。故此水蒸氣。可使輕而上升之一養化炭。變為重而下沉之二養化炭。因空氣之對流作用。不致存在室中。如欲試驗證明。可以生石灰一兩。化於二百斤之水中。取其上面澄清之水。以面盆盛之。置於燃燒之室內地下。經過一日。必有白粉沈澱於盆底。此白粉即炭酸鈣。乃由鈣養(即生石灰)吸受二養化炭而成。炭酸鈣。如其室中為一養化炭。則此石灰水。不生變化。人類處此室中。實至危險。非照上述方法。預防不可。又凡中煤毒者。驗方新編。解毒諸門。所載解煤毒方法。亦頗簡便。但用蘿蔔汁。灌其口鼻。移向風吹便醒。惟其所云房中置水一盆。則不若水壺置於爐上為宜。自來火公司所用煤氣火爐。其構造。即有水壺附於爐上。正與上述原理相同也。

幸福報 第四集

本集由幸福報第一一五十一期起至第二百期止彙訂而成每冊實售大洋一元函購寄費加一該集存書不多欲購從速 本館啓

食鹽問答

(呂子厚)

問食鹽對於人體有何作用？
答食鹽對於生理關係甚大。吾人血液千分中。約含食鹽六分。若絕緣淡食。則必日漸衰弱。飲食不進。其結果必陷於死。其效能之廣大。較他種營養素尤要。可促胃液之分泌。助血液之循環。兼能充進細胞之新陳代謝作用。使組織中之廢物排泄較速。并可維持血液滲壓之平衡。據動物之實驗。斷絕鹽類之飼養。該動物因鹽類不足之故而死者。較之餓死之期為時尤促云。

問食鹽過多則覺口渴何故？
答因食鹽過多。則血液之濃度增加。滲壓增高。體中各組織之水分被其吸收而減少。津液乾枯。遂有口渴之感。覺。亦即體中須要水分之表示也。

問舌股食鹽過多有何現象？
答食鹽亦為極毒之品。若內服大量。則口中乾燥異常。起劇烈之吐瀉。或至不救。自殺者。往往吞服食鹽二三兩。因而喪命。

問食鹽在醫藥上有何重要用途？
答食鹽在醫藥上用途頗廣。分述於後。
1. 食鹽可為健胃藥。凡胃弱而不消化者。於每次飯前。可飲鹽水一小杯。久之自有奇效。
2. 食鹽有通便之效。常患便秘者。於晨起空腹時。以開水一碗投入食鹽少許飲之。可以通利大便。此愚個人多年來屢試屢驗者也。或於每晨服止早餐。而以生雞蛋二枚打破。用開水沖之。再投入食鹽及麻油少許飲之。亦能通利大便。

肺癆病療養法

(十) 楊志一編

金匱肺癆咳嗽上氣痰飲等篇。劉河間之肺虛有火喻家言之秋燥救肺。理虛玄鑑之虛癆論。唐容川之吐血論。對於肺病之治療。開發無遺。是以中醫一見肺病。即為之治。不致釀成癆病。西醫不能治其初。聽其自然。每釀成癆也。

夫肺之能力。在乎呼吸。呼吸之原動力。在於肺絡肺管肺胞。營養肺絡肺管肺胞之原素。在於脾胃。扶助肺絡肺管肺胞之動力。在於橫膈膜。若肺絡有病。咳嗽喘滿。痰內帶紅。其原由。是否由於痰熱。或由於受風寒。由於受熱。則施以清白散。由於受風寒。則施以金匱側柏湯。若肺管有病。咳嗽頻頻。氣急不舒。其原由。是否由於風寒外束。抑熱傷元氣。風寒外束。則宜麻黃湯。熱傷元氣。則宜復脈湯。若肺胞有病。咳嗽頻頻。喘急不能安臥。其原由。是否由於痰飲上逆。抑或肺胞萎枯。鼓舞無力。氣管加力工作。由於痰飲上逆。宜芥桂朮甘湯。由於肺胞萎枯。宜甘草乾姜湯。此皆第一期肺病之治療也。

國醫章濟

蒼來滬

章濟者浙江桐廬人。家世名儒。兼習醫理。先生潛心探求。遍訪名師。以宏造就。精方脈。更善療治血症。行醫浙東。活人甚多。今漫遊海上。擬在前波路隆慶里小住。誌之以便病家之問津焉。